




CRANBERRY 700 mg cyst

کرن بری سیست
جهت درمان بیماری سیستیک



بیماری سیستیک

در بیماری سیستیک، مثانه بر اثر عفونت های میکروبی دچار التهاب می شود. از علل این بیماری می توان به شوک های عصبی، آلرژی و کاهش سیستم ایمنی بدن (بعد از رادیو تراپی) اشاره کرد.



شرکت بین المللی عسل داروکیش

نماینده انحصاری کارخانه ESI ایتالیا در خاورمیانه
دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن مشاوره پزشکی: ۰۲۱)۲۷۷۴

SMS Center : ۲۰۰۰۲۷۷۴

www.asaldarookish.com | E.mail: info@asaldarookish.com

MADE IN ITALY

این محصول صرفاً مکمل رژیمی، غذایی بوده و برای تشخیص، پیشگیری و یا درمان نمی باشد

CRANBERRY cyst

مزایای مواد موثره در مکمل غذایی

Cranberry (کرن بری):

این گیاه بومی کشور کانادا و ایالت‌های شمالی و شرقی آمریکا می باشد. تحقیقات بالینی نشان می دهد که این گیاه در کمک به درمان عفونتهای مجاری ادراری بسیار مفید می باشد. گیاه Cranberry دارای ماده ای است به نام Proanthocyanidine این ماده از اتصال باکتری های پاتوژنیک به نسج دیواره مجاری ادراری جلوگیری می کند.



Cranberry



Grape Fruit



Orthosiphon



Golden Rod

دانه های گیاه (Bearberry بیر بری) و (Grape fruit گریپ فروت):
دانه های گیاه bearberry دارای خاصیت دیورتیک (ادرار آور) می باشد و دانه های Grape fruit نیز خاصیت آنتی باکتریال دارد.

Orthosiphon (اورتوسیفون) و Golden Rod (گلدن راد):
این دو ماده موثره دارای خاصیت دیورتیک می باشند.

در صورت ابتلا به بیماری سیستیک توصیه می شود برای تحریک عمل دیورتیک ، حتما آب فراوان میل شود.

دستور مصرف:

روزانه ۱ تا ۲ قرص به همراه آب فراوان ، ترجیحاً هنگام شب میل شود.

بسته بندی:

۳ بلیستر ۱۰ عددی ۲ عدد قرص حاوی ۷۰۰ میلی گرم عصاره Cranberry می باشد که این مقدار تقریباً معادل ۸ میلی لیتر (۱ قاشق غذاخوری) عصاره خالص میوه Cranberry است.

این بیماری بیشتر در بین زنان شایع است و سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد از جمعیت زنان به این عارضه دچار می شوند. در واقع عفونتهای روده بزرگ و کوچک نزد زنان شایع تر است و دلیل این امر ساختمان دستگاه تناسلی زنان می باشد که سریع تر از مردان در معرض عفونت قرار می گیرد.

در شرایط عادی ، باکتریهای موجود در مثانه و مجرای ادراری بیماریزا نمی باشند . در صورتیکه در شرایط خاص ، باکتری های موجود در مدفوع که مهمترین آنها E. Coli ، استرپتوکوک و استافیلوکوک می باشد ، می تواند در مجرای ادراری تحتانی تکثیر شود و سپس این عفونت به مثانه سرایت کند و سبب التهاب مثانه شود.

مردانی که انسداد مجاری ادراری دارند ، مردان مسن و مردان مبتلا به ناراحتی پروستات ، بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری می باشند.

اگر بیماری سیستیک جدی گرفته نشود و زود درمان نگردد ، سبب ایجاد عفونتهای حاد کلیوی خواهد شد.

بیماری سیستیک دارای علایم بسیار ناراحت کننده و آزار دهنده می باشد. بنابر این شخص مبتلا یقیناً از وجود آن آگاه و در پی درمان آن خواهد بود.

علایم شایع این بیماری عبارتست از نیاز مکرر به ادرار کردن ، درد و سوزش هنگام ادرار کردن و تکرر ادرار.

اگر این بیماری درمان قطعی نشود ، امکان برگشت آن بسیار زیاد است.

Intake of herbal components	for 2 tab.	for 100 g
Cranberry extract conc. Tit. 1%	700 mg	46,67 g
Intake of Proanthocyanidin	7 mg	0,47 g
Bearberry titrated dry extract 20%	200 mg	13,33 g
Intake of arbutine	40 mg	2,67 g
Grapefruit seeds dry extract 4/1	100 mg	6,67 g
Orthosiphon titrated dry extract 0,2 %	100 mg	6,67 g
Intake of sinensetine	0,2 mg	0,01 g
Goldenrod titrated dry extract 10/1	100 mg	6,67 g

FOOD SUPPLEMENT IT IS NOT A MEDICINE

مکملهای غذایی ایمن و بی ضرر برای بدن

مکملهایی که در خانمها مورد مصرف دارد در سال ۲۰۰۷ میلادی مورد توجه قرار گرفت و مصرف آنها در مقایسه با سال ۲۰۰۶ ، ۲۱ درصد بیشتر شد. در شرایط حاد ، در صورت ابتلا به بیماری سیستیک مصرف آنتی بیوتیکها توصیه می شود. اما در شرایط خفیف تر و در موردهای برگشت پذیر ، استفاده از محصولات و مکملهای طبیعی بسیار سودمند است.