

Easy Flex®

Instruction for use Sepid teb Easy flex®

Product Name: Sepid teb Easy flex® Tablet

This product is supplied under Sepid teb Easy flex® Tablet, brand name which is available in 2 blisters containing 15 tablet in each one (30 tablets), plus a leaflet in a pack.

Each tablet contains below ingredients:

Glucosamine sulfate (sodium chloride salt)	333/33 mg
Chondroitin sulfate	200 mg
Avocado	100 mg
Bromelane	50 mg

Indications:

•Help to keep joint and cartilage healthy.

General guidelines:

The mentioned information is intended to supplement your general knowledge, not substitute of your physician's diagnosis or your nutritionist. Consult your doctor or other health care professional if you need more informat

Contraindications:

Patients with coagulation disorders and also those who consume Varfarin, and anti-coagulation / anti-platelet medicines, should not use this medicine.

Pregnancy and breast-feeding:

Adequate studies have not been performed in this case. Therefore taking this product

during pregnancy and breast-feeding is not recommended.

Warnings:

No case has been reported.

Precautions:

- Keep out of reach of children.
- Do not use after expiry date.
- You should be consulted with physician if you are,
- Patient with diabetes, or any special disease.
- Allergic to any special diet, such as shellfish, celery, carrots and fennel.
- consuming other medicines simultaneously.
- scheduled to have surgery.

Drug Interactions:

- simultaneously use of this product with anti coagulation and anti platelet medicine, including Varfarin, increase bleeding.
- simultaneously use with antibiotics such as Amoxicillin and Tetracycline cause to increase serum blood level.
- This product may decrease the effect of blood glucose- lowering drugs.

Dosage and administration:

- Generally, dosage & administration should be defined by physician but the usual dose is as below:
- 3 tablets a day with meal

Adverse reactions:

Each product beside its therapeutic effect

may causes some undesirable effects, although all of these adverse reactions may not seen in a person. Consult with physician or pharmacist if following reactions occur:

- Headache, nausea, gastrointestinal problems like: vomiting, diarrhea and constipation.

Storage conditions:

- Store in main pack, below 30°C and protect from light and humidity.

"The most important information of this product is mentioned in the leaflet and patient can consult with physician, pharmacist or nutritionist for more information."

Sepid Teb Easy flex® Tablet is
manufactured by **Sepid teb Nia**
Pharmaceutical Co.
Tehran-Iran

Please send comments or suggestions to:

Post Box: 1511765613

Email: Customers@sepidteb.com

References and Resources:

Herbal PDR

Latest compilation and revision:

September 2020

راهنمای مصرف قرص سپید تب ایزی فلکس®

نام فرآورده: قرص سپید تب ایزی فلکس®

این فرآورده با نام تجاری سپید تب ایزی فلکس® به شکل ۲ بلیستر ۱۵ عددی در بسته بندی ۳۰ عددی به همراه بروشور در جعبه عرضه می گردد.

هر قرص حاوی مواد به مقدار زیر می باشد:

گلوکز آمین سولفات ۳۳۳/۳۳ میلی گرم

(ملح سدیم کلراید)

کندروتین سولفات ۲۰۰ میلی گرم

آووکادو ۱۰۰ میلی گرم

بروملین ۵۰ میلی گرم

موارد مصرف:

• کمک به حفظ سلامت غضروفها و مفاصل

راهنمایی عمومی:

• اطلاعات مندرج در این راهنما در جهت افزودن به دانش عمومی شمامست و جایگزین تشخیص پزشک شما نمی باشد.
• در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا هر گونه پرسشی با پزشک و یا داروساز مشورت کنید.

موارد منع مصرف:

• در بیمارانی که وارفارین مصرف می کنند، در بیمارانی که داروهای ضد انعقاد خون/ضد پلاکت مصرف می کنند و یا در بیمارانی با اختلالات انعقادی خون نباید مصرف شود.

مصرف در دوران بار داری و شیردهی:

• به علت عدم وجود مطالعات کافی، مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها:

• هیچ موردی گزارش نشده است.

احتیاطات:

• فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

• از مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری کنید.

• شما برای مصرف این فرآورده باید با پزشک مشورت کنید

اگر:

- دچار واکنش های آلرژیک و یا حساسیت به هر نوع رژیم

غذایی از جمله نرم تنان صدف دار، کرفس، هویج و رازیانه

هستید

- همزمان داروهای دیگر مصرف می کنید.

- دچار دیابت و یا هر گونه بیماری خاص هستید.

- قصد عمل جراحی دارید.

تداخلات دارویی:

• مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد انعقاد و ضد

پلاکت از جمله وارفارین.

• مصرف همزمان با آنتی بیوتیک هایی چون آموکسی سیلین

و تتراسایکلین سبب افزایش سطح سرمی آنها می شود.

• این فرآورده ممکن است موجب کاهش اثر داروهای پائین

آورنده قند خون می شود.

مقدار و نحوه مصرف فرآورده:

• بطور کلی مقدار و نحوه مصرف توسط پزشک مشخص

می گردد اما مقدار مصرف معمول بشرح زیر است:

- ۳ قرص در روز، همراه با غذا

عوارض جانبی:

هر فرآورده بموازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز

بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در

یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک

یا داروساز مشورت نمایید:

• سردرد، سرگیجه، مشکلات گوارشی از قبیل تهوع، اسهال

و یا یبوست.

شرایط نگهداری:

• فرآورده را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه

سانتی گراد نگهداری نمایید.

"اهم مطلب مرتبط با فرآورده در برگه راهنما عنوان شده

است و مصرف کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر

می توانند با پزشک، داروساز یا متخصص تغذیه مشورت

نمایند"

قرص سپید تب ایزی فلکس® توسط

شرکت داروسازی سپید تب نیا عرضه

می گردد.

تهران- ایران

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به:

صندوق پستی: ۱۵۱۱۷۶۵۶۱۳ و یا

پست الکترونیکی:

Customers@sepidteb.com ارسال فرمایید.

مراجع و منابع:

Natural Medicines Comprehensive Database

2013

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

شهریور ۱۳۹۹