

Melatonin

1mg Lozenge Chewable Tablet

Instruction for use Melatonin Lozenge Chewable Tablet 1mg

Product Name: Melatonin Lozenge Chewable Tablet 1mg

This product is available in 3 blisters containing 10 tablets in each, plus a leaflet in a pack.

Indications:

- Help to improve sleep quality and sleep regulation.
- Use as sleep aid to manage jet lag.

General guidelines:

- The mentioned information is intended to Complete your general knowledge, not substitute of your physician's diagnosis.
- Follow your physician's instruction and do not raise the dosage of this product.
- Consult with physician or pharmacist if you need more information.

Contraindication:

This product should not be taken in patients whom are using Warfarin,Anticoagulant/Antiplatelet drugs, and also patient with blood coagulation disorders.

Pregnancy and breast-feeding:

In pregnant women or those who have decided to get pregnant, the consumption of this product is contraindicated. Owing to the fact that adequate studies have not been performed in this case, so taking this

product during lactation is not recommended.

Warnings:

No case has been reported.

Precautions:

- Keep out of reach of children.
- Do not use after expiry date.
- Since Melatonin cause daytime drowsiness, thus avoid driving and using devices which require full consciousness. You should be consulted with physician if you are:

- Suffering from any special disease.
- Taking any other medicines.
- Allergic to any special diet.
- Taking antihypertensive medications.
- Patient with diabetes, due to the fact that, Melatonin may decrease glucose utilization and increase insulin resistance, which would increases blood glucose concentrations.

Drug Interactions:

- Concomitant consumption of Melatonin with alcohols, benzodiazepine or other sedative drugs, intensificate the sedative effects of each one, so these products should not be taken at the same time.
- Melatonin reduces the effect of hypoglycemic medicines.
- Caffeine reduces pharmacological effect

of Melatonin.

- Contraceptives raise the Melatonin blood concentration.
- Melatonin can interfere with the function of immunosuppressant Medicines therefore avoid using at the same time.
- Simultaneous consumption of Melatonin and Nifedipine increase heartbeat rate and systolic blood pressure.

Dosage and Administration:

Generally, dosage and administration should be defined by physician but the usual dose is as below:

- ① One tablet daily, 30 minutes before bedtime.

Adverse Reactions:

"Each product beside its therapeutic effect may cause some undesirable effects, although all of these adverse reactions have not seen in a person. Consult with physician or pharmacist if below occurs."

Melatonin is perfectly tolerable in low dosage. The most common complications are:

- Fatigue, dizziness, headache, irritability, drowsiness, hypotension and gastrointestinal disorders such as: vomiting, nausea and abdominal cramps.

Storage conditions:

Store below 30°C and protect from light and humidity in main box.

"The most important information of this product is mentioned in the leaflet and patient can consult with physician or pharmacist for more information."

Melatonin Lozenge Chewable

Tablet 1 mg, is Lisenced by **Sepid**

Teb Nia Pharmaceutical Co.

Manufactured by Hegmatan Daru

Gharb

Hamedan-IRAN

Please send your Comments and Suggestions to:

Postbox: 1511765613

Email: customers@sepideb.com

References:

Natural Medicine Comprehensive Database 2012

Date of last revision:

September 2020

ملاتوئین

قرص مکیدنی جویدنی ۱ میلی گرم

راهنمای مصرف قرص جویدنی مکیدنی ملاتوئین ۱ میلی گرم

- **نام فرآورده:** قرص مکیدنی جویدنی ملاتوئین ۱ میلی گرم
- **قرص مکیدنی جویدنی ملاتوئین ۱ میلی گرم، درسته بندی ۳۰ عددی، بصورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی قرص به همراه بروشور درون جعبه مقوایی عرضه می‌گردد.**
- **موارد مصرف:** کمک به تنظیم خواب مناسب راهنمایی‌های عمومی؛ اطلاعات مندرج در این راهنمای در جهت افزودن به داشت عمومی شماست و جایگزین تشخیص پزشک شما نمی‌باشد.

- **بر طبق دستور پزشک مصرف نموده و از افزایش مصرفی بپرهیزید.**
- **در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا هر گونه بررسی با پزشک یا داروساز مشورت کنید.**
- **موارد منع مصرف:** در بیمارانی که وارفارین مصرف می‌کنند، در بیمارانی که داروهای ضدانعدام خون/ضدپلاکت مصرف می‌کنند و یا در بیماران با اختلالات انعقادی خون نباید مصرف شود.

- **صرف در بارداری و در شیردهی:** در افراد باردار یا افرادی که قصد باردار شدن دارند منع مصرف دارد. بعلت عدم وجود مطالعات کافی در

"هم مطالب مرتبط با فرآورده در برگه راهنمای عنوان شده است، مصرف کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با پزشک یا داروساز تماس بگیرند."

قرص مکیدنی جویدنی ملاتوئین ۱ میلی گرم دارنده پروانه ساخت: شرکت داروسازی سپید طب نیازی کارخانه تولید کننده: شرکت داروسازی همگمندان داروی غرب همدان-ایران

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این فرآورده به صندوق پستی: ۱۵۱۱۷۶۵۶۱۳ و یا

پست الکترونیکی: Customers@sepidteb.com

ارسال فرمایید.

مراجع و منابع:

Natural Medicine Comprehensive Database 2012

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:
۱۳۹۹ شهریور

• کافئین موجب کاهش اثر ملاتوئین می‌شود.
• کنتراپستیوها موجب افزایش غلظت خونی ملاتوئین می‌شوند.

• ملاتوئین در عملکرد داروهای مهارکننده سیستم ایمنی ایجاد اختلال می‌کند، لذا بایستی هم زمان مصرف نشوند.

• مصرف هم زمان ملاتوئین و نیفیدپین موجب افزایش فشار خون سیستولیک و ضربان قلب می‌گردد.

• مقدار و نحوه مصرف:
• بطور کلی مقدار و نحوه مصرف تو سطح پزشک مشخص می‌گردد اما مقدار مصرف معمول بشرح زیر است:

- روزانه یک قرص، ۳۰ دقیقه قبل از خواب مصرف شود.

عوارض جانبی:

• هر فرآورده به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در سک فرد دیده نمی‌شود در صورت بروز عوارض زیر یا پیشک یا داروساز مشورت نمانید."

• ملاتوئین در دوز پایین کاملاً قابل تحمل می‌باشد. شایع ترین عوارض آن شامل:

- خستگی، سرگیجه، سردرد، تحریک پذیری و خواب آلودگی و افت فشار خون، مشکلات گوارشی خفیف از قبیل تهوع، استفراغ و کرمپ های شکمی.

• **شرایط نگهداری:**
فرآورده را دور از نور و رطوبت، درون جعبه و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.