

Sepid teb Urinaid®

Capsule

Instruction for use **Sepid teb Urinaid®** capsule

Product Name: Sepid teb Urinaid® 250 mg capsule

Each capsule contains:

250 milligrams of cranberry and 100 mg of sour tea. The cranberry's extract of the name Vaccinium macrocarpon contains Vit C, beta-carotene, alfa tucophorol and other compounds that results antibacterial and antioxidant effects of this plant. Also, the extract of Hibiscus sabdariffa contains significant amounts of Vit C, anthocyanin, which simultaneously helps to increase the protective effect of urinary tract against infections.

Indications:

- Prevention of urinary tract infections, bladder and odor in people with urinary incontinence.
- Preventing blockage of urinary tract.
- In cardiovascular diseases and as a blood pressure lowering.
- Prevents edema and water retention in the body.
- Colds and upper respiratory tract infections.
- Oscillations, pneumonia.
- In chronic fatigue syndrome.

- Antioxidants effect and prevention of cancer.
- Reduce appetite

General guidelines:

The mentioned information is intended to supplement your general knowledge, not substitute of your physician's diagnosis. Follow your physician's instruction and do not raise the dosage of this product. Consult with your physician or pharmacist if you need more information.

Contraindication :

No data available.

Pregnancy and breast feeding:

Due to the lack of adequate studies, this product should be supervised by the physician during pregnancy and lactation.

Warnings:

No case has been reported.

Precautions:

- Consult with your physician before taking this product in case of:
 - You have certain allergies to medicines, aspirin, salicylic acids, foods, preservatives and ...
 - You take other medicines, warfarin, acetaminophen.
 - You have diseases like indigestion,

diabetes and kidney stones.

Drug interactions:

No case has been reported .

Dosage and Administration:

Generally, dosage and administration should be defined by physician but the usual dose is as below:
1 capsule twice a day.

Adverse reaction:

Each product beside its desirable effect may cause some adverse effects, although all of these adverse reactions have not seen in a person. This product is perfectly tolerable in low dosage.

The most common complications are:

Fatigue, dizziness, headache, gastrointestinal disorders such as vomiting, nausea, diarrhea and abdominal cramps.

Storage conditions:

- Store below 30°C and protect from light and humidity in the box.
- Keep out of reach of children.
- Do not use after expiry date.

"The most important information of this product is mentioned in the leaflet and patient can consult with physician or pharmacist for more information."

Sepid teb Urinaid®

capsules are available in a box containing 30 capsules as 2*15 blisters, with a leaflet. Licensed by Sepid teb nia. Tehran-Iran

Please send your Comments and Suggestions to:

Postbox: 19395-1737

Email: customers@sepidteb.com

References:

- Natural Medicine Comprehensive Database, 2013, p:496-500,838-839
 - PDR for Herbal Medicines, third edition, p:435.
- Database: Dec 2017

راهنمای مصرف کپسول سپید طب یورین اید®

نام فرآورده: کپسول سپید طب یورین اید®

محتویات هر کپسول:

هر کپسول حاوی ۲۵۰ میلی گرم کرن بری و ۱۰۰ میلی گرم چای ترش می‌باشد. عصاره میوه کرن بری با نام علمی *Vaccinium macrocarpon* حاوی ویتامین ث، بتاکروتین، آلفاتوکوفرول و دیگر ترکیباتی می‌باشد که سبب بروز اثرات آنتی‌باکتریال و آنتی‌اکسیدانی قوی این گیاه می‌گردد. همچنین عصاره گیاه *Hibiscus sabdariffa* (چای ترش) نیز حاوی مقادیر زیادی از ویتامین ث و آنتوسیانین می‌باشد که مصرف همزمان آن با کرن بری سبب تقویت اثر حفاظتی مجاری ادراری در برابر عفونت می‌شود.

موارد مصرف:

- پیشگیری از عفونت مجاری ادراری، مثانه و از بین برنده بوی نامطبوع در افرادی که دچار بی‌اختیاری ادرار هستند.
- جلوگیری از انسداد مجاری ادراری.
- در بیمساری های قلبی-عروقی به عنوان کاهش دهنده فشارخون.
- جلوگیری از ادم و احتباس آب در بدن.
- سرماخوردگی و عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی.
- اسکوربی، ذات الریه.
- در سندرم خستگی مزمن.
- آنتی‌اکسیدان و کمک به پیشگیری از سرطان.

• کاهش اشتها.

راهنمای عمومی:

- قبل از مصرف این فرآورده در صورت وجود موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت داشتن حساسیت به داروها، آسپرین، سالیسیلیک اسید، غذاها، مواد محافظ و ...
- در صورت مصرف هرگونه دارو نظیر وارفارین، استامینوفن.
- در صورت داشتن بیماری خاص، سوءهاضمه، دیابت و سنگ کلیه.
- اطلاعات مندرج در این راهنما در جهت افزودن دانش عمومی شما است و جایگزین تشخیص پزشک شما نمی‌باشد.
- برطبق دستور پزشک مصرف نموده و از افزایش دوز مصرفی بپرهیزید.
- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و هرگونه پرسش با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

موارد منع مصرف:

موردی گزارش نشده است.

هشدارها:

هیچ موردی گزارش نشده است.

مصرف در بارداری و شیردهی:

به دلیل عدم وجود مطالعات کافی مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی می‌بایست زیر نظر پزشک باشد.

نحوه و مقدار مصرف:

بطور کلی مقدار و نحوه مصرف توسط پزشک مشخص میگردد اما مقدار مصرف معمول این فرآورده به شرح زیر است:

کپسول دو بار در روز همراه یا بدون غذا

تداخل‌های دارویی:

موردی گزارش نشده است.

عوارض جانبی:

این فرآورده به خوبی توسط بدن تحمل میشود و عوارض جانبی خاصی وجود ندارد.

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمیشود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

خستگی، سرگیجه، سردرد، مشکلات گوارشی خفیف از جمله مشایه اثر یک ملین ملایم، تهوع، استفراغ، و یا دل درد با مصرف این مکمل دیده شود.

شرایط نگهداری فرآورده:

- دور از نور و رطوبت درون جعبه و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- ”اهم مطالب مرتبط با فرآورده در برگه راهنما عنوان شده است و مصرف کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با پزشک، داروساز یا متخصص تغذیه تماس بگیرند.“

کپسول سپید طب یورین اید®

در بسته‌بندی ۳۰ عددی بصورت دو بلیستر ۱۵ عددی به همراه بروشور درون جعبه عرضه میگردد. دارنده پروانه ساخت شرکت داروسازی سپید طب تیا ایران - تهران

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این فرآورده به:

صندوق پستی: ۱۷۲۷-۱۹۲۹۵ و یا

پست الکترونیکی:

Customers@sepidteb.com ارسال فرمایید.

مراجع و منابع:

- Natural Medicine Comprehensive Database, 2013, p:496-500,838-839
- PDR for Herbal Medicines, third edition, p:435.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

دیماه ۹۶